

RECUPERO DE ESQUEMAS ATRASADOS, EDADES MÁXIMAS DE VACUNAS E INTERVALOS MÍNIMOS 2024

VACUNA	EDAD MÍNIMA	INTERVALO MÍNIMO ENTRE DOSIS			CONSIDERACIONES
		1° a 2°	2° a 3°	3° a 4° o Ref ¹	
BCG	Antes del egreso de la maternidad.				CNV ² : Única dosis a partir de 1500 gr. Serología Negativa a VIH (Maternidades) Con esquemas atrasados, sin documentación y sin cicatriz se recomienda la vacunación hasta los 6 años, 11 meses y 29 días.
Hepatitis B monovalente Biovac Hb [®] Engerix B [®]	Al nacimiento ^a	1 mes	2 meses		CNV: vacunación universal. Intervalo mínimo entre la 1° y la 3° dosis: 4 meses. La tercera dosis no debe aplicarse antes de los 6 meses de vida. ^b Esquema rápido: 4 dosis 0-7-21 días ó 0-14-28 días ó 0-30-60 días y todos estos esquemas requieren una 4ta dosis a los 12 meses de la primera dosis.
Hexavalente (DTPa-Hib-HB-IPV) Infanrix hexa [®] ó Hexaxim [®]	6 semanas	1 mes	1 mes	6 meses	CNV: vacunación del esquema inicial para nacidos prematuros de <37 semanas con <1500 gramos al nacer.
Pentavalente (DTP-Hib-HB), DPT	6 semanas	1 mes	1 mes o 6 meses (como dosis final)	6 meses	CNV: se utiliza la vacuna pentavalente en nacidos de término (≥ 37 semanas), vacuna DPT al ingreso escolar. Edades máximas varían según laboratorio. Edad máxima DPT: 6 años, 11 meses y 29 días. Dosis varían de acuerdo a la edad de inicio del esquema: <ul style="list-style-type: none"> < 1 año: 3 dosis + 1° Ref¹ a partir de los 15-18 meses y 2° Ref¹ a partir de 4 años. 1 año a 3 años: 3 dosis + 1° Ref¹ y 2° Ref¹ a partir 4 años a los 6 meses de la última dosis. 4 a 6 años: 3 dosis + 1 Ref¹ A partir de los 7 años continuar con un esquema de 3 dosis (última con 6 meses de intervalo de la última dosis) con vacuna DTaP-Salk, dTap o dT. Sanos hasta los 5 años se requiere el componente <i>Hib</i> . La inmunización completa anti Hib se define como haber recibido: <ul style="list-style-type: none"> - al menos una dosis de vacuna a los 15 meses de vida o después - ó 2 dosis entre los 12 y 14 meses - ó una serie primaria de 2 – 3 dosis antes de los 12 meses más 1 dosis de refuerzo a los 12 meses o después.
Quíntuple acelular (DTaP-Hib-Salk). Pentaxim [®]	6 semanas	1 mes	1 mes o 6 meses (como dosis final)	6 meses	Como parte del 1° Ref ¹ al año de vida (15-18 meses).
Vacuna Tetravalente acelular (DTaP-Salk) Tetraxim [®]	5 años (edad recomendada)	1 mes	1 mes o 6 meses (como dosis final)	6 meses	Edad recomendada 5 - 6 años. Edad máxima 13 años.

RECUPERO DE ESQUEMAS ATRASADOS, EDADES MÁXIMAS DE VACUNAS E INTERVALOS MÍNIMOS 2024

VACUNA	EDAD MÍNIMA	INTERVALO MÍNIMO ENTRE DOSIS			CONSIDERACIONES
		1° a 2°	2° a 3°	3° a 4° o Ref ¹	
Triple Bacteriana acelular (dTpa) Bustrix® ó Adacel®	4 años				Como Ref ¹ al ingreso escolar, 11 años, embarazadas, personal de la salud, convivientes de prematuros y en adultos.
Vacuna neumococo conjugada 13 valente (PCV13) Prevenar®	6 semanas a partir de 1800 gr ^c	1 mes	1 o 2 meses (como dosis final)	1 o 2 meses (como dosis final)	CNV: Huésped sano se recupera hasta los 5 años. Las dosis varían de acuerdo a la edad de inicio: <ul style="list-style-type: none"> • 6 sem. a 11 meses: esquema de 2 dosis primarias con un Ref¹ a los 12-15 meses. • Entre 12 y 23 meses: 2 dosis. • ≥ 2 años e inmunocompetentes: 1 dosis. • ≥ 2 y < 6 años con inmunocompromiso, fistula de LCR o implante coclear: 1 dosis si recibieron 3 dosis de PCV7 o PCV13 antes de los 24 meses o 2 dosis si han recibido un esquema incompleto de ≤ de 2 dosis antes de los 24 meses de edad. • ≥ 6 años con inmunocompromiso, fistula de LCR o implante coclear: 1 dosis a los que no hubiesen recibido el esquema o tuviesen esquema incompleto.
Vacuna neumococo conjugada 20 valente (PCV20) Prevenar®	6 semanas a partir de 1800 gr.	1 mes	1 mes	2 meses	El esquema varía según la edad de inicio: <ul style="list-style-type: none"> • Hasta 6 meses y prematuros: esquema 3 + 1 (con Ref¹ 11 a 15 meses) • 7 a 11 meses: 2+1 (Ref¹ 11 a 15 meses) • 12-23 meses: 1 dosis y 1 Ref¹ (intervalo mínimo 8 semanas) • A partir de 2 años: 1 dosis. • CNV: incorporación de la PCV20 en reemplazo del esquema secuencial de PCV13-PPSV23 en ≥ 5 años con factores de riesgo y ≥ 65 años.
Rotavirus monovalente Rotarix®	6 semanas	1 mes	-	-	CNV: Edad máxima de 1° dosis: 14 sem. y 6 días. Edad máxima 2° dosis: 6 meses y 0 días
Rotavirus pentavalente Rotateq®	6 semanas	1 mes	1 mes	-	Edad máxima de 1° dosis: 12 sem. Edad máxima 3° dosis: 8 meses.
Vacuna polio inactivada (Salk) ^d	6 semanas	1 mes	1 mes o 6 meses (como dosis final)	6 meses	CNV: Las dosis varían de acuerdo a la edad de inicio: <ul style="list-style-type: none"> • < 7 años: 3 dosis más 1 Ref¹ • ≥ 7 años: 2 dosis más 1 Ref¹ Se recupera hasta los 18 años (excepto viajeros).
Meningococo conjugada tetravalente conjugada con proteína CRM197 Menveo®	2 meses	2 meses	2 meses		Las dosis varían de acuerdo a la edad de inicio: <ul style="list-style-type: none"> • 2 a 6 meses de edad: esquema de 3 dosis: 2 dosis + 1 Ref¹ a los 15 meses. • ≥ 7 a 23 meses: 1 dosis + 1 Ref¹ • ≥ 2 años: 1 dosis. En niños con riesgo incrementado de enfermedad meningocócica 2 dosis y Ref¹ cada 5 años.

RECUPERO DE ESQUEMAS ATRASADOS, EDADES MÁXIMAS DE VACUNAS E INTERVALOS MÍNIMOS 2024

VACUNA	EDAD MÍNIMA	INTERVALO MÍNIMO ENTRE DOSIS			CONSIDERACIONES
		1° a 2°	2° a 3°	3° a 4° o Ref ¹	
Meningococo tetravalente conjugada con la proteína transportadora de toxoide tetánico Nimenrix®	6 semanas	2 meses	2 meses		<p>CNV: niños con cohorte de nacimiento a partir de octubre de 2016 y año 2006 en adolescentes (como dosis única, independientemente de dosis previas).</p> <p>Los Ref¹ varían de acuerdo a la edad de inicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 semanas a <6 meses: 2 dosis + 1 Ref¹ al ≥ 1 año. • 6 semanas a <12 meses: 1 dosis +1 Ref¹ a partir de ≥ 1 año. • ≥ 12 meses: 1 dosis.
Meningococo tetravalente conjugado con toxoide tetánico Menquadfi®	12 meses		-		<p>1 dosis después de los 12 meses de vida o como Ref¹ en la dosis correspondiente a los 15 meses u 11 años.</p> <p>*Indicada también para adultos única dosis.</p>
Vacuna meningococo recombinante b Bexsero®	2 meses	1 o 2 meses	1 o 2 meses	2 meses o 6 meses	<p>Dosis e intervalos varían de acuerdo a la edad y el inicio del esquema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 a 5 meses: 2 o 3 dosis con intervalo de 2 meses y Ref¹ entre 12 a 23 meses con 6 meses de intervalo de la última dosis. • 6 a 11 meses: 2 dosis con 2 meses de intervalo + Ref¹ a partir del segundo año de vida con 2 meses de intervalo de la última dosis. • 12-23 meses: 2 dosis separadas por dos meses y un Ref¹ a los 12 a 23 meses de la serie primaria. • ≥ 24 meses: dos dosis separadas por 1 mes. <p>Considerar un Ref¹ en personas con riesgo de enfermedad meningocócica o inmunosuprimidos.</p> <p>CNV: Incorporación de MenB en asplenia anatómica o funcional, déficit de factores terminales del complemento (C5-C9), tratamiento con eculizumab, niños con infección por VIH/SIDA y trabajadores que manipulan o procesan cultivos bacteriológicos.</p>
Hepatitis A Vaqta 25® Avaxim 80® Havrix 720®	12 meses ^e	6 meses			<p>CNV: cohorte de nacimiento a partir del año 2004. Única dosis a los 12 meses.</p>
Triple Viral (Sarampión, rubeola y paperas) ^f MMRII®	12 meses ^f	28 días			<p>CNV: Se recomienda una dosis a los 12 meses y una segunda dosis a los 5-6 años.</p> <p>Adolescentes y adultos (nacidos a partir de 1965) no vacunados en la infancia: 2 dosis.</p>
Cuádruple Viral (Sarampión, rubeola, paperas y varicela) Proquad®	12 meses ^g	28 días			<p>Intervalo recomendado 3 meses.</p>
Varicela Varivax® o Varilrix®	12 meses ^g	28 días			<p>CNV: cohorte de nacimiento a partir octubre de 2013. Se recomienda una dosis a los 15 meses y una segunda dosis a los 5-6 años.</p> <p>Niños y adolescentes no vacunados, sin antecedente de enfermedad o seronegativos: 2 dosis.</p>

RECUPERO DE ESQUEMAS ATRASADOS, EDADES MÁXIMAS DE VACUNAS E INTERVALOS MÍNIMOS 2024

VACUNA	EDAD MÍNIMA	INTERVALO MÍNIMO ENTRE DOSIS			CONSIDERACIONES
		1° a 2°	2° a 3°	3° a 4° o Ref ¹	
Fiebre amarilla Stamaril®	6 a 9 meses en situaciones de riesgo				CNV: zonas de riesgo: 2 dosis a los 18 meses y 11 años. Viajeros: 1 dosis de por vida.
HPV cuadrivalente o nonavalente Esquema de 2 dosis Gardasil® o Gardasil 9®	9 años	6 meses			Recomendación individual: esquemas en inmunocompetentes menores de 14 o 15 años, respectivamente.
HPV cuadrivalente o nonavalente Esquema de 3 dosis Gardasil® o Gardasil 9®	9 años	1 mes	3 meses		Recomendación individual: esquemas en inmunocompetentes mayores de 14 o 15 años, respectivamente e inmunocomprometidos. Intervalo mínimo entre 1° y 3° dosis de 6 meses.
HPV cuadrivalente o nonavalente Esquema 1 dosis Silgard o Gardasil 9®	9 años				CNV: cohorte de nacimiento 2000 para mujeres y 2006 para varones. Se recomienda a los 11 años. A partir del 1 de enero de 2024 se recomienda 1 sola dosis. En caso de recuperado de esquemas atrasados: Única dosis de vacuna hasta los 20 años. Dos dosis (0 y 6 meses) en caso de inicio de esquema entre los 21 a 26 años. En personas con inmunocompromiso: se mantiene la Vacunación con 3 dosis (0 - 2 y 6 meses) hasta los 26 años.
Vacuna influenza trivalente o tetravalente	6 meses	28 días			CNV: entre los 6 meses y 2 años, a partir de los 65 años (vacuna antigripal adyuvantada), embarazadas, trabajadores de la salud y huéspedes de riesgo como diabetes, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatía congénita, obesidad mórbida, desnutrición y conviviente de prematuro e inmunosuprimidos. Dosis anual. Se recomiendan dos dosis para la primovacunación en menores de 9 años.
Vacuna influenza tetravalente de alta dosis Efluelda®	A partir de los 65 años				Indicación a personas a partir de los 65 años, única dosis anual. Otorga una protección reforzada. Vacuna inactivada, de virus fraccionados. Contiene: 60 µg de hemaglutinina en cada cepa. (4 veces más que otras vacunas antrigripales)
Fiebre Hemorrágica Argentina	15 años				CNV: Utilizada para zonas endémicas Edad máxima 64 años.

RECUPERO DE ESQUEMAS ATRASADOS, EDADES MÁXIMAS DE VACUNAS E INTERVALOS MÍNIMOS 2024

VACUNA	EDAD MÍNIMA	INTERVALO MÍNIMO ENTRE DOSIS			CONSIDERACIONES
		1° a 2°	2° a 3°	3° a 4° o Ref ¹	
Vacuna Antirrábica Verorab [®] (células Vero)					Esquema Pre-Exposición 3 dosis: Día 0- 7 y 28, ésta última puede reemplazarse por día 21. Por vía IM en deltoides. Post Exposición 2 esquemas probables en persona no inmunizadas previamente Protocolo Essen modificado: día 0-3-7-14 a 28 por vía IM en deltoides. Protocolo Zagreb: día 0, 2 dosis el mismo día una en cada deltoides (adulto) día 7 y día 21.
Vacuna Herpes Zoster Shingrix ^{® h}	Mayores de 50 años	1 mes			Indicación individual en mayores de 50 años: 2 dosis, la segunda dosis se administra de 2 a 6 meses después de la primera dosis. En pacientes inmunocomprometidos mayores de 18 años son 2 dosis, la segunda a partir de 1 mes a 6 meses como máximo.
Vacuna para Dengue Qdenga [®]	A partir de los 4 años.	3 meses			Indicación individual en personas con o sin antecedentes de dengue. CNV: Estrategia focalizada entre 15 a 39 años que residen en departamentos priorizados.
Vacuna para VSR Abrysvo [®]	Embarazadas y adultos a partir de 60 años.				CNV: Embarazadas entre la semana 32 y 36.6 Indicación individual en adultos.
Vacuna para VSR Arexvy [®]	Adultos a partir de los 60 años.				Indicación individual en adultos.

1. Ref.: refuerzo 2. CNV: Calendario Nacional de Vacunación

- a. Si el niño se vacuna con un peso menor de 2000 gramos, se le deben aplicar 4 dosis en el primer año.
- b. Si recibió vacunas combinadas se recomiendan 4 dosis totales (monovalente al nacimiento y tres dosis de vacuna combinada).
- c. Esquema utilizado dentro de los programas de vacunación. Inmunocomprometidos o con riesgo incrementado: esquema de 3 dosis + 1 refuerzo.
- d. La vacuna IPV puede ser administrada en presentación monovalente o en forma de vacunas combinadas en cualquier de las dosis.
- e. La administración de una única dosis ha sido adoptada en Argentina y algunos países ya que ha demostrado ser efectiva con vacunación universal.
- f. En caso de brote y/o epidemia, una dosis cero se puede adelantar a los 6 meses de edad, pero en este caso debe aplicarse también las dosis de rutina que se administra a los 12 meses y 5-6 años; ya que, si se coloca la dosis antes del año de edad, ésta no cuenta para el esquema.
- g. Se puede usar a partir de los 9 meses en situaciones especiales.
- h. Indicado en la prevención del herpes zóster (HZ) y de la neuralgia posherpética (NPH).